



Mönchspfeffer

ZYKLUS & STOFFWECHSEL

Gattilier - Cycles et métabolisme
Monnikspeper - cyclus en stofwisseling
Monk's Pepper - Cycle and metabolism
Agnocasto - ciclo e metabolismo

DE Einzelfuttermittel für Pferde

Stabilisierung und positive Beeinflussung von Zyklus und Stoffwechsel.

Zusammensetzung: Mönchspfeffer 100 %.

Fütterungshinweis: Pferde (600 kg KGW) 15 - 20 g täglich, Kleinpferde 10 - 15 g täglich. 1 Esslöffel entspricht 8 g. Ganze Samen unter das Futter mischen. Mönchspfeffer nicht während der Trächtigkeit füttern, nach der Bedeckung absetzen!

Darreichungsform: ganze Samen.

FR Complément alimentaire pour chevaux

Stabilisation et effet positif sur le cycle de la jument et métabolisme.

Composition : 100 % gattilier.

Recommandations de dosage : Cheval (600 kg) 15 à 20 g par jour, double-poney 10 à 15 g par jour. 1 cuillère à soupe correspond à 8 g. Mélanger les graines entières à la nourriture. Ne pas donner de gattilier pendant la gestation, arrêter après la saillie !

Présentation : Graines entières.

NL Aanvullend diervoeder voor paarden

Stabilisering en positieve beïnvloeding van cyclus en stofwisseling.

Samenstelling: Monnikspeper 100 %.

Voer-instructie: paard (600 kg) 15 - 20 g dagelijks, kleine paarden 10 - 15 g dagelijks. 1 eetlepel zijn 8 g. Gehele zaad droet het voer mengen. Monnikspeper niet aan drachtige paarden voeren, na het dekking niet meer voeren!

Toedieningswijze: hele zaden.

EN Supplement for horses

Stabilisation and positive influence from cycle and metabolism.

Composition (mixture) of: Monk's pepper 100%.

Feeding instructions: Horses (600 kg) 15 - 20 g daily, small horses 10 - 15 g daily. 1 tablespoon equates 8 g. Mix the whole seeds into the horse feed. Do not use Monk's pepper during gestation, and stop using straight away after covering!

Pharmaceutical form: whole seeds.

IT Alimento semplice per cavalli

Stabilizza e influenza positivamente il ciclo e il metabolismo.

Composizione: agnocasto 100%.

Indicazione d'alimentazione: cavalli (PC 600 kg) 15 - 20 g al giorno, cavalli di taglia piccola 10 - 15 g al giorno. 1 cucchiaio da tavola corrisponde a 8 g. Mischiare i semi nel mangime. Non somministrare i semi di agnocasto durante la gestazione, interrompere dopo l'accoppiamento!

Forma farmaceutica: semi interi

Analytische Bestandteile - Constituants analytiques -

Analytische bestanddelen - Analytical components - Componenti analitici

Rohprotein - protéines brutes - ruw eiwit - crude protein - proteine grezze	7,1 %
Rohfaser - fibres brutes - ruwe celstof - crude fibre - fibre grezze	35,0 %

Los Nr. und MHD Ende: Siehe Aufdruck.

Registrier-Nr.: α DE SL 100011

Futtermittel kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nach Anbruch zügig verbrauchen.

Numéro d'identification du lot et date limite de consommation : Voir impression

Numero d'enregistrement : α DE SL 100011

Conservier au frais, au sec et à l'abri de la lumière du soleil. A consommer rapidement après ouverture.

Lot nr. en MHD einde: Zie opdruk.

Registreeer: α DE SL 100011

Koel en droog bewaren. Beschermen voor direct zonlicht. Na opening snel consumeren.

Batch no. and best before date: See label.

Regist. no.: α DE SL 100011

Store the feed in a cool, dry place and keep out of direct sunlight. To be consumed as soon as possible once open.

N. lotto e data di scadenza: Vedi stampa.

N. di registrazione: α DE SL 100011

Conservare il mangime in un luogo asciutto, fresco e protetto dai raggi solari diretti. Da consumare rapidamente una volta aperto.



381127D

Krämer Pferdesport
4, Industriestraße 1 • 2
D-68764 Hockenheim
Tel. +49(0)180-6949400
www.kraemer.de

Felix Bühler
Ringstrasse Nord 43
CH-5600 Lanzburg
Tel. +41(0)848-803380
www.felixbuehler.ch

500 g e

